

Левитра

Действующее вещество: Варденафил* (Vardenafil*)

Состав и форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой

Показания:

Эректильная дисфункция (неспособность достигать и сохранять эрекцию, необходимую для совершения полового акта).

Противопоказания:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

одновременное применение с нитратами или препаратами, которые являются донаторами оксида азота;

комбинация с такими ингибиторами протеаз ВИЧ, как индинавир или ритонавир.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

При следующих заболеваниях:

врожденное удлинение интервала QT;

анатомическая деформация полового члена (искривление, кавернозный фиброз, болезнь Пейрони);

заболевания, предрасполагающие к приапизму (серповидно-клеточная анемия, множественная миелома, лейкопения);

нарушение функции печени;

заболевание почек в терминальной стадии;

артериальная гипотензия (сАД в покое — ниже 90 мм рт. ст.);

недавно перенесенный инсульт и инфаркт миокарда;

нестабильная стенокардия;

наследственные дегенеративные заболевания сетчатки (например пигментный ретинит);

склонность к кровотечениям и обострение язвенной болезни;

аортальный стеноз и идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз.

Побочные действия:

Левитра, в целом, переносится хорошо, побочные эффекты, как правило, незначительно или умеренно выражены и имеют преходящий характер.

Нервная система: головокружение, головная боль.

Сосудистая система: "приливы" (ощущение жара, покраснение кожи лица, "горячие вспышки").

Дыхательная система: застойная гиперемия слизистой оболочки носа (отек слизистой, ринит, ринорея).

Пищеварительная система: диспепсия, тошнота.

Способ применения и дозы:

Внутрь, независимо от приема пищи.

В начале лечения рекомендуемая доза составляет 10 мг (приблизительно за 25–60 мин до сексуального контакта). Однако было показано, что Левитра эффективна и при приеме за 4–5 ч до сексуальной активности. Максимальная частота приема препарата — 1 раз в сутки. В зависимости от эффективности и переносимости лечения доза может быть увеличена до 20 мг или снижена до 5 мг в сутки. Максимальная рекомендованная доза — 20 мг 1 раз в сутки. Для обеспечения адекватной реакции на лечение необходима сексуальная стимуляция.